

HOUTINSECTICIDE-P NW



Tegen houtworm en huisboktor



Voldoende voor: 2 m² (500 ml verpakking)

Voldoende voor: 4 m² (1 Liter verpakking)

Dosering: klaar voor gebruik,
250 ml p/m².

Werkzame stoffen: Permethrin

Gehalte: 2 g/l

ALGEMEEN

Luxan Houtinsecticide-P NW verdelgt houtworm en andere houtaantastende insecten en voorkomt bij een juiste toepassing gedurende lange tijd heraanastang. Het houtwerk eerst van stof, vuil en boormeel ontdoen. Dit moet droog geschieden. Bij aantasting van de huisboktor is het gewenst eerst de boorgangen open te steken en het boormeel zoveel mogelijk uit te borstelen. Boormeel en afvalhout moeten worden verwijderd en bij voorkeur verbrand. Alvorens het hout met dit middel te behandelen eerst aanwezige beits, verf of waslagen verwijderen. Voor het verduurzamen dient het hout alle benodigde bewerkingen te hebben ondergaan, zoals boren, kepen, e.d.

Het middel dient in onverdunde vorm te worden aangebracht.

GEBRUIKSAANWIJZIGING

CURATIEVE TOEPASSING

Op het te behandelen oppervlak tenminste 200 gram per m² (dit is ca. 250 ml per m²) van het middel opbrengen d.m.v. bespuiten onder lage druk met grove druppel. De vereiste hoeveelheid zo nodig in meer dan één bewerking opbrengen, zodanig dat per bewerking de vloeistof juist niet afdruipt. Voor het bestrijden van de grote houtworm (*Xestobium rufovillosum*) moet het houtwerk plaatselijk onder druk worden geïnjecteerd.

Waarschuwing:

Niet toepassen op plaatsen die toegankelijk zijn voor kinderen van 0 – 4 jaar. Dit middel is gevaarlijk voor vissen en andere waterorganismen; voorkom verontreiniging van oppervlaktewater.

ATTENTIE

Het verdient aanbeveling periodiek en in elk geval ca. 1 jaar na de toepassing te controleren of de behandeling afdoende is geweest. Wordt weer boormeel aangetroffen dan het hout, eventueel plaatselijk, opnieuw met dit middel behandelen.

Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

