

# LUXAN MCPA 500 vlb.



## Tegen onkruiden

in volgroeide gazons, grasland, onder bomen en struiken etc.



Voldoende voor ruim: 4.000 m<sup>2</sup> ( bij 850 ml )

*Dosering: zie  
gebruiksaanwijzing*

Werkzame stoffen: MCPA

Gehalte: 500 g/l

### ALGEMEEN

**LUXAN MCPA 500 vlb.** Is een groeistofachtig bladherbicide met systemische werking. Het middel werkt tegen éénjarige en overblijvende tweezaadlobbige onkruiden. Grassen worden niet gedood. De onkruiden kunnen zowel in een jong als in een oud stadium worden bestreden. De onkruiden dienen voldoende blad te hebben gevormd. Het middel werkt het beste bij groeizaam weer, het dient niet te worden toegepast bij felle zonneschijn. Tijdens de toepassing van het middel en enkele uren daarna dient het droog te zijn. Bij de toepassing van het middel dienen het gewas en de onkruiden droog te zijn. Het middel kan schade doen aan veel gewassen, de toepassing dient daarom zeer zorgvuldig te geschieden. Zeer gevoelige gewassen zijn bijvoorbeeld bieten in een jong stadium en witlof tevens in een laat stadium in de zomer en de herfst. Het middel dient met een grove druppel en bij lage druk te worden verspoten.

### GEBRUIKSAANWIJZIGING

In deze gebruiksaanwijzing worden alleen die toepassingen genoemd die voor **particulier gebruik** belangrijk zijn. Toegepast met een rugspruit en met **10L spuitoplossing kan gemiddeld 100 m<sup>2</sup>** worden bespoten.

WEILAND (waarin geen vee aanwezig is.)

- Tegen **akkerdistel**, 20-30 ml per 10L water, toepassen tijdens bloemknopstadium of in de naweide, mits voldoende blad aanwezig is;
- Tegen **boterbloem**, 20 ml per 10L water, toepassen bij het begin van de bloei ( eind april- half mei) of in de nazomer (september), mits voldoende blad aanwezig is;
- Tegen **paardenbloem**, 20-30 ml per 10L water, vóór de bloei in het voorjaar, of in de nazomer, mits voldoende blad aanwezig is;
- Tegen **paardenstaarten** (heermoes en lidrus), 10 ml per 10L water, toepassen enige malen per seizoen vanaf half april met tussenruimten van 3 á 4 weken (dit enkele jaren achtereen volhouden);
- Tegen **russen**, 40 ml per 10L water, toepassen eind mei, als de bladeren 25cm lang zijn; 3 weken na toepassing bladeren afmaaien;
- Tegen **kraailook**, 40 ml per 10L water, toepassen eind april- begin mei, als de bladeren 25 cm lang zijn;
- Tegen **kruiskruid** (waterkruiskruid en Jacobskruiskruid), 40 ml per 10L water, toepassen eind juli -begin augustus. Herhaling is in het volgende jaar meestal noodzakelijk.

**Na toepassing in weiland hierin tenminste één week geen vee toelaten, teneinde het middel voldoende gelegenheid te geven goed in de onkruiden door te dringen.**

#### GAZONS EN SPORTVELDEN

**Dosering:** 20-30 ml per 10L water

Tegen **weegbree, boterbloem, madeliefje** gedurende het groeiseizoen. Madeliefjes bij voorkeur in juli/augustus bestrijden. Niet toepassen op pas gezaaide of zeer jonge gazons.

#### WEGBERMEN

**Dosering:** 20-30 ml per 10L water

Slechts bij uitzondering gebruiken en dan nog uitsluitend pleksgewijs, wanneer **akkerdistels** overlast veroorzaken.

#### AKKERRANDEN EN RANDEN VAN WEILANDEN

**Dosering:** 20-30 ml per 10L water

Ter bestrijding van **akkerdistel** en andere onkruiden.

Voorkom overwaaien van de spuitvloeistof naar gevoelige gewassen.

#### PERMANENT ONBETEELDE TERREINEN

Ter bestrijding van **akkerdistel** en andere onkruiden.

**Dosering:** 40-60 ml per 10L water, zonodig in combinatie met andere onkruidbestrijdingsmiddelen toepassen.

#### ONDER APPEL- EN PERENBOMEN EN ONDER WINDSCHERMEN

**Dosering:** 20-40 ml per 10L water

Ter voorkoming van beschadiging verdient het aanbeveling het middel met een grove druppel en met gebruikmaking van een afschermkap te verspuiten. Uitsluitend na de bloei van de bomen spuiten. Niet bij appels en peren toepassen welke korter dan 2 jaar ter plaatste staan.

**N.B.** men dient er rekening mee te houden, dat peren in het algemeen gevoeliger voor dit middel zijn dan appels, zoals onder meer op lössgronden is gebleken.

#### BESSEN (RODE, ZWARTE EN KRUISBESSEN)

**Dosering:** 20ml per 10L water. Toepassen ter bestrijding van windesoorten na de oogst en nadat de eindknoppen gesloten zijn. Zwarte bessen en kruisbessen zijn gevoeliger voor MCPA dan rode bessen.

#### IN HOUTIGE GEWASSEN, IN PARKEN EN PLANTSOENEN

**Dosering:** 25 ml per 10L water.

Voor pleksgewijze bestrijding van windesoorten in een opgaande begroeiing. Voorzichtig toepassen met behulp van een afschermkap voordat de ranken van de winde de stammen en/of takken hebben bereikt.

#### OP TALUDS VAN WATERGANGEN EN OP DROGE SLOOTBODEMS

**Dosering:** 30ml per 10L water.

Uitsluitend pleksgewijs toepassen. Voor bestrijding van hinderlijke akkeronkruiden zoals akkerdistel, akkermelkdistel en dergelijke op taluds en droge slootbodems.

**Niet overdoseren en geen gieter gebruiken om schade aan het gras, groeiremming en tijdelijke geelverkleuring, te voorkomen.**

#### ATTENTIE

Voor een goede opname van het middel een week voor en na de toepassing het gazon/grasland niet maaien. 's Avonds toepassen bij droog, groeizaam en windstil weer. Spuit met een grove spuitdruppel en voorkom overwaaien naar planten die niet bestreden moeten worden. Het gemaaide gras de eerste drie maaibeurten na de bespuiting niet op de composthoop gooien en niet vervoederen (zie ook de veiligheidstermijn). Niet toepassen op **jonge, pas ingezaaide** gazons, sportvelden of weilanden.

## WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

toegestaan is uitsluitend het gebruik als:

### 1. Onkruidbestrijdingsmiddel:

- in de teelt van granen, aardappelen, vlas, graszaad, asperges en gladiolen;
- in weiland waarin geen vee aanwezig is; alsmede in grasgroenbemesters
- in gazons en sportvelden;
- in wegbermen, tegen akkerdistel, mits pleksgewijs toegepast;
- op tijdelijk onbeteeld land, op akkerranden en randen van weilanden;
- op permanent onbeteelde terreinen;
- in de fruitteelt onder appel- en perenbomen, onder windschermen, alsmede in de teelt van bessen;
- in houtige gewassen in parken en plantsoenen tegen windesoorten;
- in de teelt van griend en riet;
- op taluds van watergangen en op droge slootbodems, mits pleksgewijs toegepast.

### 2. middel ter bestrijding van doorwas in aardappelen.

Dit middel niet gebruiken tussen 1 september en 1 maart.

*Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.*

---



DCM Nederland B.V. – Valkenburgseweg 62-a – 2223 KE Katwijk. [www.luxan.eu](http://www.luxan.eu)

